Notas de Geometria Algébrica

Anotações, sugestões, complementos de TSpringer.

9 de setembro de 2018

19:40

$S = k[x_1, \dots, x_n]$, k alg. fechado.

$$\mathbb{A}^n = k^n \supseteq Z;$$

$I(Z) = \{f \in S \mid f(z) = 0 \forall z \in Z\}$: ideal de Z .

$J \subseteq S$; $V(J) := \{x \in \mathbb{A}^n \mid f(x) = 0 \forall f \in J\}$:

conjunto algébrico; variedade afim. Fato:

$V(J) = V(\langle J \rangle)$, mesmos zeros do ideal gerado.

Fechados da topologia de Zariski.

exemplos

- $\mathbb{A}^n = V(0); \emptyset = V(1)$
- $f \in S, f \notin k : V(f) =$ hipersuperfície;
hiperplano, quádrlica,
- $X = V(J) \Rightarrow X = \bigcap_{f \in J} V(f) :$ toda variedade é interseção de hipersuperfície.
- Teorema da base de Hilbert: interseção finita.
- $M := M_{m \times n}(k) = \mathbb{A}^{mn} \supseteq M^p :=$ matrizes de posto $< p$; anulação dos menores dets. $p \times p$.
 $M^1 = \{C \in M \mid \exists A \in M_{m \times 1}, B \in M_{1 \times n} \text{ t.q. } C = A \cdot B\}$
- $SL_n = \{A \in M_{n \times n} \mid \det(A) = 1\}$, grupo especial linear.
 $O_n = \{A \mid {}^t A A = I\}$ subgrupo ortogonal...

1.1.2. (i) I ideal próprio em $S \Rightarrow V(I) \neq \emptyset$

(ii) $I(V(I)) = \text{rad}(I)$

TZHilbert (fraco): $\mathfrak{m} \subset S$ max $\Rightarrow$

$\exists c_1, \dots, c_n \in k, \mathfrak{m} = \langle x_1 - c_1, \dots, x_n - c_n \rangle$.

$I \subseteq \mathfrak{m} \Rightarrow V(I) \supseteq V(\mathfrak{m}) = \{(c_1, \dots, c_n)\} \Rightarrow (i)$.

$$f \in I(V(I)), f \neq 0; I^\# = I \cdot k[x_1, \dots, x_n, t] \Rightarrow$$

$$J := I^\# + \langle tf - 1 \rangle \text{ não tem zeros em } \mathbb{A}^{n+1}$$

$$\stackrel{(i)}{\Rightarrow} J = \langle 1 \rangle \Rightarrow \exists \text{ relação}$$

$$1 = (tf - 1) \cdot h + \sum g_i(x, t)h_i(x), h_i \in I.$$

Aplicando o homo

$$k[x_1, \dots, x_n, t] \rightarrow k(x_1, \dots, x_n), t \mapsto 1/f$$

resulta $1 = \sum g_i(x, \frac{1}{f})h_i(x) = \sum \frac{\gamma_i(x)}{f^{m_i}}h_i(x) \Rightarrow$

$$f^M = \sum \gamma_i(x)f^{M-m_i}h_i(x) \Rightarrow f \in \text{rad}(I).$$

Exc. (ii) $\Rightarrow$ (i).

irredutíveis

X esp. topológico $\neq \emptyset \Rightarrow$ equiv.:

(i) todo aberto $\neq \emptyset$ é denso;

(ii) $\forall Y, Z \subset X$, se Y, Z são fechados próprios então $Y \cup Z \neq X$.

(i) $\Rightarrow$ (ii): $X \setminus Z$ e $X \setminus Y$ são abertos $\neq \emptyset$, logo densos $\Rightarrow (X \setminus Z) \cap (X \setminus Y) \neq \emptyset \Rightarrow Z \cup W \neq X$.

Recipr.=exercício.

X é *irredutível* se satisfaz (i) (ou (ii):-).

Redutível caso contrário.

$X \supseteq Y$ subesp. topol.

Y é irred. $\iff$ sua aderência $\overline{Y}$ é irred.

($\implies$) Sejam $U, U' \subseteq \overline{Y}$ abertos não vazios.

Então $U \cap Y, U' \cap Y$ são abertos de Y para a topologia induzida, ambos $\neq \emptyset$. Segue

$$U \cap U' \neq \emptyset.$$

Recipr.=exc.

1.2.4. X e.top. noetheriano $\Rightarrow X$ admite só um número finito de subesp. top. irredutíveis maximais. Estes são fechados e cobrem X .

(Noeth. significa dcc para cadeias de fechados.)

Suponha demonstrado que $X = X_1 \cup \dots \cup X_m$,
união finita de fechados irredutíveis.

Seja Y irredutível maximal;

$Y = Y \cap X_1 \cup \dots \cup Y \cap X_m \Rightarrow Y = Y \cap X_i$
para algum i , logo $Y \subseteq X_i$, igual por maxim^{de}.

Exc.: dcc $\iff$ toda coleção não vazia de subesp. fechados admite membro minimal.

Forme a coleção $\mathcal{Y}$ dos subesp.top. fechados $Y \subseteq X$ que **não se escrevem** como união finita de fechados irredutíveis. Queremos mostrar $\mathcal{Y} = \emptyset$. Negando, existirá membro minimal $Y \subseteq X$ em $\mathcal{Y}$. Temos Y redutível (por que?), $Y = Y' \cup Y''$, ambos fechados próprios.

Por minimalidade, Y', Y'' não são membros de $\mathcal{Y} \dots \square$

As (¿os?) componentes irredutíveis de X são os fechados irredutíveis maximais.

X noeth. $\Rightarrow$ união finita de comps.irreds.

top.Zariski: irred. $\iff$ ideal primo

$X = V(I) \subset \mathbb{A}^n$ não vazio é irred.

$\iff I(X)$ é ideal primo de $S := k[x_1, \dots, x_n]$

($\implies$) Sejam $f, g \in S, fg \in I(X)$. Temos

$$V(fg) \supseteq X \implies V(f) \cup V(g) \supseteq X \implies V(f) \supseteq X$$

(digamos) $\implies f \in \text{rad}(I(X)) = I(X)$.

($\impliedby$) $X = Y \cup Z$ fechados $\implies I(X) = I(Y) \cap I(Z)$

$\implies I(X) = I(Y)$ (digamos) $\implies X = Y$.

Exc.: complete os detalhes acima.

k -álgebra afim $\leftrightarrow$ conjunto algébrico

$X \subseteq \mathbb{A}^n$ subconjunto algébrico $\leftrightarrow I =$ ideal de S
 $k[X] :=$ anel das restrições de funções
polinomiais em X

$I = I(X)$ ideal radical = $\ker(S \twoheadrightarrow k[X])$:

$$S \ni f \mapsto f|_X.$$

$k[X]$ é álgebra afim, *i.e.*,

- tipo finito sobre k e
- sem nilpotentes $\neq 0$.

X é “determinado” por $k[X]$

Por enquanto, enunciado meramente top.conjuntista:

$X \ni x \leftrightarrow \mathfrak{m}_x = \text{ideal das funções que se anulam em } x.$

$$X \leftrightarrow \text{Max}(k[X])$$

$X \supseteq Y = \text{fechado} \leftrightarrow \text{ideal } I(Y) \subseteq k[X];$

componentes irredutíveis de $X \leftrightarrow$

ideais primos minimais de $k[X];$

componentes conexas de $X \leftrightarrow ?$

base de abertos

X = conjunto algébrico, $f \in k[X]$

$$D(f) = \{x \in X \mid f(x) \neq 0\} = X \setminus V(f)$$

$U \subseteq X$ aberto $\Rightarrow Y := X \setminus U = V(I)$ fechado
 $\Rightarrow Y = \bigcap_{f \in I} V(f) \Rightarrow U = \bigcup D(f)$.

$$D(f) \subseteq D(g) \Rightarrow V(f) \supseteq V(g) \Rightarrow$$

$I(V(f)) \subseteq I(V(g)) \Rightarrow f^m \in \langle g \rangle$ para algum $m \geq 1$.

separar fechados disjuntos

$Y, Z \subset X$ fechados, $Y \cap Z = \emptyset \Rightarrow \exists$

aberto $U \subset X$ tal que $Y \subseteq U, U \cap Z = \emptyset$.

$Y = V(I), Z = V(J), I, J$ ideais de $k[X] \Rightarrow$

$\emptyset = V(I + J) \Rightarrow I + J = 1 \Rightarrow \exists f \in I, g \in J$

$$f + g = 1.$$

Agora para cada $y \in Y$ vale $g(y) = 1$.

Faça $U = D(g)$.

funções regulares

X = variedade afim, $x \in X$, denotamos

$\mathcal{F}_x$ = coleção dos germes de funções

$f : U \rightarrow k$ definidas em alguma viz. aberta $U \ni x$.

Lembramos que

$$(f_1 : U_1 \rightarrow k), (f_2 : U_2 \rightarrow k) \in \mathcal{F}_x$$

representam o mesmo germe em x se existir

aberto $x \in U_3 \subset U_1 \cap U_2$ tal que as restrições

$f_1|_{U_3} = f_2|_{U_3}$. Trata-se de rel. equiv. Cada classe

de equiv. é chamada um germe de função em x .

funções regulares

$\mathcal{F}_x$ é naturalmente um anel.

Um germe de função $f \in \mathcal{F}_x$ é *regular* em $x \in X$ se existirem

- uma viz. aberta $U \ni x$ e
- funções $g_x, h_x \in k[X]$ tais que $h_x(x) \neq 0$, $f(y) = h_x(y)^{-1}g_x(y) \forall y \in U \cap D(h_x)$.

Denotamos $\mathcal{O}_{X,x}$ a coleção dos germes de funções regulares em x .

Exc.: $\mathcal{O}_{X,x}$ é um anel local.

Para cada aberto $U \subseteq X$ temos um anel $\mathcal{O}_X(U)$ formado pelas funções cujos germes são regulares em todos os pontos de U .

1.4.5 Se X é uma variedade afim, então o homomorfismo natural $k[X] \xrightarrow{\phi} \mathcal{O}_X(X)$ é iso.

Lembramos que $\mathcal{O}_X(X)$ é subanel do anel das funções $X \rightarrow k$. Claro que o mapa ϕ é injetivo e podemos considerar $k[X] \subseteq \mathcal{O}_X(X)$.

Para mostrar a igualdade na inclusão acima, pegue $f \in \mathcal{O}_X(X)$. Forme a coleção

$$\mathcal{D}_f = \{g \in k[X] \mid g \cdot f \in k[X]\},$$

ideal dos denominadores de f .

$$\mathcal{D}_f = \{g \in k[X] \mid g \cdot f \in k[X]\}.$$

Devemos mostrar que $1 \in \mathcal{D}_f$.

Negando, existe ideal maximal $\mathfrak{m} \supseteq \mathcal{D}_f$.

Sendo k alg. fechado, temos $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_x$,

associado a algum ponto $x \in X$.

f regular em $x \Rightarrow$ existem $g_x, h_x \in k[X]$ tais que

$$g_x(x) \neq 0 \quad \text{e} \quad f(y) = g_x(y)^{-1} \cdot h_x(y)$$

para todo y em alguma vizinhança (ab.) U de x .

Agora $Z := X \setminus U$ é fechado disjunto de $\{x\}$, logo existe $u \in k[X]$ tal que $u(Z) = 0, u(x) = 1$.

$$\text{Assim, } g_x(y)f(y) = h_x(y) \quad \forall y \in U$$

$$\Rightarrow u(y)g_x(y)f(y) = u(y)h_x(y) \quad \forall y \in X \Rightarrow$$

$$u \cdot g_x \in \mathcal{D}_f \subseteq \mathfrak{m}_x, \text{ contradição.}$$

Feixe de funções regulares

X = variedade afim, $U \subseteq X$ aberto $\rightsquigarrow$

$\mathcal{O}_X(U)$ = anel das funções regulares em U .

$U \subseteq V \subseteq X$ abertos $\rightsquigarrow$ mapa de restrição

$$\rho_{UV} : \mathcal{O}_X(V) \longrightarrow \mathcal{O}_X(U)$$

$$f \longmapsto f|_U.$$

Se $U = \bigcup_{\alpha \in \mathbb{N}} U_\alpha$ é uma cobertura aberta e

para cada α temos elementos $f_\alpha \in \mathcal{O}_X(U_\alpha)$ tais que

$\forall U_{\alpha\beta} := U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ valer $f_\alpha|_{U_{\alpha\beta}} = f_\beta|_{U_{\alpha\beta}}$

então existe um e um só $f \in \mathcal{O}_X(U)$ tal que

$$f|_{U_\alpha} = f_\alpha \quad \forall \alpha \in \mathbb{N}.$$

espaços anelados (ringed spaces)

X = espaço topológico munido de um feixe de anéis:

- coleção de anéis $\{\mathcal{R}(U) \mid U = \text{aberto de } X\}$
- $\forall U \subseteq U'$ abertos, tem-se homo. (restr.)

$$\rho_{UU'} : \mathcal{R}(U') \longrightarrow \mathcal{R}(U)$$

tais que $\forall U \subseteq U' \subseteq U''$ abertos,

$$\rho_{UU''} = \rho_{UU'} \circ \rho_{U'U''}$$

- Se $U = \bigcup_{\alpha \in \mathbb{N}} U_\alpha$ é uma cobertura aberta...

Exemplo modelo: X = variedade afim munida do feixe estrutural $\mathcal{O}_X$.

$\mathbb{P}^n$

=coleção dos **subespaços de dim. 1** de k^{n+1}

$$\pi : k^{n+1} \setminus 0 \longrightarrow \mathbb{P}^n$$

$$(x_0, \dots, x_n) \mapsto (x_0 : \dots : x_n)$$

$\mathbb{P}^n$ é munido da topologia quociente:

$Z \subseteq \mathbb{P}^n$ é fechado $\iff \pi^{-1}Z$ fechado em $k^{n+1} \setminus 0$.

$\widehat{Z} := \pi^{-1}Z \cup \{0\}$ é um cone com vértice 0,
união de **retas** $\ni 0$.

Lema. $Z \subseteq k^{n+1}$ é fechado invariante por homotetias $\iff I(Z)$ é ideal homogêneo.

($\implies$) Tome $F \in I(Z)$, $F = F_0 + \cdots + F_d$, F_i homog. de grau i . Para cada $z \in Z, t \in k$ tem-se $t \cdot z \in Z$. Logo

$0 = F(tz) = F_0(z) + tF_1(z) + \cdots + t^d F_d(z)$,
polinômio em t nulo para todo t ... $\square$

($\impliedby$): Exc.

V ou F: I ideal homog. $\iff \text{rad}(I)$ homog.

Para cada polinômio homog. $F \in k[x_0, \dots, x_n]$
denota-se $\mathbb{V}(F) = \{x \in \mathbb{P}^n \mid F(x) = 0\}$.

$F \neq 0 \rightsquigarrow \mathbb{V}(F)$ é dito uma hipersuperfície projetiva.

Exc. $Z \subseteq \mathbb{P}^n$ é fechado $\iff$ é uma interseção
de hipersuperfícies projetivas.

$\mathbb{D}(F) = \mathbb{P}^n \setminus \mathbb{V}(F)$ aberto básico.

$\deg F = 1 \implies \mathbb{D}(F)$ homeomorfo ao hiperplano
afim $V(F - 1) \subset \mathbb{A}^{n+1}$.

$$\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}$$

Para cada aberto $U \subseteq \mathbb{P}^n$, definimos

$$\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(U) = \left\{ \frac{F}{G} \mid F, G \text{ homog. mesmo grau, } G(x) \neq 0 \forall x \in U \right\}.$$

- $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(\mathbb{P}^n) = k$
- $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(\mathbb{D}(H)) = \left\{ \frac{F}{H^m} \mid \deg F = m \deg H \right\}$
- $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}(\mathbb{D}(X_0)) = \left\{ \frac{F}{X_0^m} \mid \deg F = m \right\} \simeq k\left[\frac{x_1}{x_0}, \dots, \frac{x_n}{x_0}\right]$

Exc: $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^n}$ é um feixe.

morfismos de espaços anelados

$$f : (X, \mathcal{R}) \longrightarrow (Y, \mathcal{S})$$

• mapa contínuo $f : X \longrightarrow Y$ (por abuso)

• para cada aberto $U \subseteq Y$, homo. de anéis

$$f_U^\# : \mathcal{S}(U) \longrightarrow \mathcal{R}(f^{-1}U)$$

compatível com as restrições de abertos $U' \supseteq U$:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{S}(U') & \xrightarrow{f_{U'}^\#} & \mathcal{R}(f^{-1}U') \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{S}(U) & \xrightarrow{f_U^\#} & \mathcal{R}(f^{-1}U) \end{array}$$

$f : (X, \mathcal{R}) \longrightarrow (Y, \mathcal{S})$ é um isomorfismo se existir $g : (Y, \mathcal{S}) \longrightarrow (X, \mathcal{R}) \dots$

Se X, Y são variedades afins, cada morfismo

$$f : (X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$$

corresponde a um e um só homo

$$\mathcal{O}_Y(Y) \longrightarrow \mathcal{O}_X(X)$$

$$\parallel \qquad \parallel$$

$$k[Y] \longrightarrow k[X]$$

Exc. $x \mapsto (x^2, x^3)$ é um morfismo bijetivo de $\mathbb{A}^1$ em $V(y^2 - x^3) \subset \mathbb{A}^2$. Isomorfismo?

(pré-)variedades

Um espaço anelado $(X, \mathcal{O}_X)$ é uma pré-variedade se existir uma cobertura aberta finita $X = \bigcup X_\alpha$ tal que cada $(X_\alpha, \mathcal{O}_X|_{X_\alpha})$ é isomorfo a uma variedade afim.

Prop. $\mathbb{P}^n$ é uma pré-variedade.

$$\mathbb{P}^n = \bigcup D(X_i), \quad D(X_i) \simeq \mathbb{A}^n.$$

Se X é pré-var., idem para cada $Y \subseteq X$ aberto ou fechado com a estrutura induzida.

produtos

Sejam X, Y objetos em uma categoria.

Um objeto Z é um produto de X, Y se

$$Z \xrightarrow{p} X$$

existem morfismos $q \downarrow$
 Y

tais que $\forall \varphi \downarrow$
 Y

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{\pi} & X \\ & \searrow \theta & \uparrow \\ & & Z \\ & \swarrow & \leftarrow & Y \end{array} \quad \exists! \theta : W \longrightarrow Z \text{ t.q.}$$

$$\pi = p \circ \theta$$

$$\varphi = q \circ \theta$$

$$Z = X \times Y,$$
$$p, q \text{ \u00fanicos...}$$

produto de variedades afins $\iff$ produto tensorial

X, Y, Z variedades afins. Cada diagrama de morfismos

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{p} & X \\ q \downarrow & & \\ & & Y \end{array}$$

corresponde aos homomorfismos

$$\begin{array}{ccc} k[Z] & \xleftarrow{p^\#} & k[X] \\ q^\# \uparrow & & \\ & & k[Y] \end{array}$$

Segue que o produto de variedades afins corresponde ao produto tensorial:

$$k[X \times Y] = k[X] \otimes_k k[Y]$$

mini-curso de álgebra tensorial

k =anel, $M, N, P = k$ -módulos. Forme a categoria com objetos $M \times N \xrightarrow{\beta} P$ =mapa k -bilinear e morfismos diagramas comutativos

$$M \times N \xrightarrow{\beta} P$$

$$\gamma \downarrow \quad \swarrow \lambda$$

Q

onde β, γ são bilineares, λ linear.

Um objeto $M \times N \xrightarrow{\alpha} R$ é **inicial** se para todo

objeto $M \times N \xrightarrow{\beta} P \exists! \lambda_{\beta} : R \rightarrow P$ t.q.

$$\beta = \lambda_{\beta} \circ \alpha.$$

existe e é único

Forme o módulo livre $\mathcal{L}$ com base o conjunto

$M \times N$. Considere o submódulo $\mathcal{R} \subset \mathcal{L}$

gerado pelos elementos

$$(m + cm', n) - (m, n) - c(m', n),$$

$$(m, n + cn') - (m, n) - c(m, n')$$

$$\forall m, m' \in M, n, n' \in N, c \in k.$$

Por fim defina $M \otimes N := \mathcal{L}/\mathcal{R} \xleftarrow{\otimes} M \times N$

$$m \otimes n = (m, n) + \mathcal{R} \xleftarrow{\otimes} (m, n)$$

Cada elemento de $M \otimes N$ é combinação linear

de **indecomponíveis**.

Exc: $\otimes$ é bilinear, universal.

$$A \otimes_k B$$

Se A, B são k -álgebras, em particular são k -módulos. Resulta que $A \otimes_k B$ é uma A -álgebra, idem B -álgebra, induzindo por restrição a mesma estrutura de k -álgebra:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & A & & a \\
 & \nearrow & & \searrow & \\
 k & & & & a \otimes 1 \\
 & \longrightarrow & & & A \otimes_k B \\
 & \searrow & & \nearrow & \\
 & & B & & b \\
 & & & & 1 \otimes b
 \end{array}$$

$$(a \otimes b)(a' \otimes b') = aa' \otimes bb'.$$

1.5.2 $A, B = k$ -álgebras sem divisores de zero

(nilp) $\Rightarrow A \otimes_k B$ também.

Tome $f = \sum a_i \otimes b_i, g = \sum c_j \otimes d_j \in A \otimes_k B, fg = 0$.

Podemos supor $\{b_i\}, \{d_j\}$ l.i.

(e.g., $a \otimes b + a' \otimes b' + a'' \otimes (b + b') =$
 $(a + a'') \otimes b + (a' + a'') \otimes b'$.)

Suponha, por contradição, $a_1 c_1 \neq 0$.

$\exists h : A \rightarrow k, h(a_1 c_1) \neq 0$.

$0 = fg = \sum a_i c_j \otimes b_i d_j; \rightsquigarrow$

$A \otimes B \xrightarrow{h \otimes 1} B \rightsquigarrow$

$0 = (h \otimes 1)(fg) = \sum h(a_i c_j) b_i d_j =$

$\sum h(a_i) b_i \sum h(c_j) d_j \Rightarrow$ digamos $\sum h(a_i) b_i = 0$.★

1.6.3. Prop. O produto de prevariedades existe e é único a menos de iso.

Escreva $X = \cup U_i, Y = \cup V_j$ cobertura aberta afim, finita. Faça conjuntivamente $X \times Y$.

Declaramos $U \subset X \times Y$ aberto se cada

$U \cap (U_i \times V_j)$ o for em $U_i \times V_j$.

Uma função f definida numa viz. ab. V de $x \in U_i \times V_j$ é dita regular em x se assim o for sua restrição a $V \cap (U_i \times V_j)$.

Temos assim um espaço anelado localmente afim, *i.e.*, uma pré-variedade. Verifica-se que as propriedades categóricas de produto são satisfeitas.

Hausdorff

Um esp.top. X é Hausdorff se pontos distintos podem ser separados por abertos disjuntos.

Munindo $X \times X$ da **topologia produto**, isso é equiv. a exigir que a diagonal $\Delta \subseteq X \times X$ seja fechada. De fato, se $X \times X \supseteq \Delta$ é fechada, dados $x \neq y$ em X , existem abertos $U, V \subseteq X$ tais que $x \in U, y \in V$ e $U \times V \subset X \times X \setminus \Delta$, ou seja, $(U \times V) \cap \Delta = \emptyset \Rightarrow U \cap V = \emptyset$. Recipr. exc.

variedades

Uma pré-variedade X é uma variedade se sua diagonal $\Delta_X \subset X \times X$ é fechada. Lembre que em $X \times X$ a topologia NÃO é a do produto: existem abertos que não são união de produtos de abertos. Por exemplo, em $\mathbb{A}^2 = \mathbb{A}^1 \times \mathbb{A}^1$ a diagonal é fechada mas não é igual a interseção de produtos de fechados...Exc.

Se X é var. afim, então $\Delta_X \subset X \times X$ é fechada, definida pelas equações

$$x_i = y_i, i = 1..n$$

onde $k[X] = k[x_1, \dots, x_n]$, $k[X \times X] = k[x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n]$.

Se X é var., então toda sub-pré-var. de X (aberta ou fechada) é var.

$\mathbb{P}^n$ é var. Veja a seguir. . . (ou diretamente, equações da diagonal de $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^n$.)

critérios de separação

- 1.6.12. Prop. (i) $X =$ variedade, $U, V \subseteq X$ abertos afins $\Rightarrow U \cap V$ aberto afim e as imagens por restrição de $\mathcal{O}_X(U), \mathcal{O}_X(V)$ em $\mathcal{O}_X(U \cap V)$ geram esta k -álgebra;
- (ii) $X =$ pré-variedade, $X = \cup V_i$ cobertura aberta afim. Então X é variedade $\iff$:
 $\forall (i, j), V_i \cap V_j$ é afim e as imagens por restrição de $\mathcal{O}_X(V_i), \mathcal{O}_X(V_j)$ em $\mathcal{O}_X(V_i \cap V_j)$ geram.

(i) $U \cap V \simeq \Delta_X \cap (U \times V)$ fechado em afim

$\Rightarrow U \cap V$ afim e suas funções regulares são restrições das de $U \times V$, a saber, $k[U] \otimes k[V]$, por sua vez gerada por $k[U] \otimes 1$ e $1 \otimes k[V]$.

(ii) Exc.

9 de setembro de 2018

1.6.11. Prop. Y =variedade, X pré-var.

(i) Se $f : X \rightarrow Y$ é um morfismo, então seu gráfico $\Gamma_f = \{(x, f(x)) \mid x \in X\}$ é fechado em $X \times Y$;

(ii) Se $f, g : X \rightarrow Y$ são morfismos que coincidem em um aberto denso, então $f = g$.

Na situação de (i), considere o mapa contínuo $X \times Y \ni (x, y) \mapsto (f(x), y) \in Y \times Y$. Temos $\Gamma_f =$ imagem inversa do fechado Δ_Y , logo é fechado.

Para (ii), similar.

$X := \mathbb{A}^2 \setminus \{0\}$ não é afim

$$\mathcal{O}_X(X) = \{f/g \mid f, g \in k[x, y], g(a, b) \neq 0 \forall (a, b) \neq 0\}$$

Mas $g(a, b) \neq 0 \forall (a, b) \neq 0 \Rightarrow g = \text{constante} \neq 0$.

$$\text{Logo, } \mathcal{O}_X(X) = k[x, y] = k[\mathbb{A}^2].$$

Se X fosse afim, a inclusão $X \subseteq \mathbb{A}^2$
corresponderia ao mapa identidade em $k[x, y]$
 $\Rightarrow$ inclusão seria = .

1.6.13. “reta com ponto dobrado”

$0' \in X = \mathbb{A}^1 \cup \{0'\}$. Abertos afins
 $X_0 = \mathbb{A}^1$, $X_{0'} = \mathbb{A}^1 \setminus \{0\} \cup \{0'\} \simeq \mathbb{A}^1$.

Temos dois mapas, $f, f' : \mathbb{A}^1 \rightarrow X$ que coincidem no aberto denso $\mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$, mas

$$f(0) = 0 \neq f'(0) = 0'.$$

Logo X é pré-var., mas não é variedade.

$$\mathbb{P}^m \times \mathbb{P}^n$$

O mapa $\mathbb{P}^m \times \mathbb{P}^n \xrightarrow{s} \mathbb{P}^{(m+1)(n+1)-1}$

$$x = (x_0 : \cdots : x_m), y = (y_0 : \cdots : y_n) \longmapsto (x_i y_j)$$

pode ser imaginado como multiplicação da matriz

$$(m+1) \times 1 : {}^t x = \begin{pmatrix} x_0 \\ \vdots \\ x_m \end{pmatrix} \text{ pela matriz } y, 1 \times (n+1)$$

resultando a matriz

$$(m+1) \times (n+1) : (z_{ij} = x_i y_j) \text{ de posto } 1.$$

$$\text{Segre: } \mathbb{P}^m \times \mathbb{P}^n \xrightarrow{s} \mathbb{P}^{(m+1)(n+1)-1}$$

Trata-se de um mergulho, *i.e.*, isomorfismo sobre sua imagem, que é subvariedade fechada com equações

$$z_{ij}z_{rs} = z_{is}z_{rj}; \text{ (equiv : } \begin{vmatrix} z_{ij} & z_{is} \\ z_{rj} & z_{rs} \end{vmatrix} = 0), \\ 0 \leq i, r \leq m, 0 \leq j, s \leq n.$$

A imagem inversa

$$s^{-1}\mathbb{D}_{z_{ij}} = \mathbb{A}^m \times \mathbb{A}^n \subset \mathbb{P}^m \times \mathbb{P}^n, x_i \neq 0 \neq y_j.$$

Fazendo $i = j = 0$, nesses abertos coordenados

$$(x_0 = 1 : x_1 : \dots : x_m) = (x_1, \dots, x_m)$$

$$(y_0 = 1 : y_1 : \dots : y_n) = (y_1, \dots, y_n)$$

o mapa s se expressa

$$(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n) \mapsto$$

$$(x_1, \dots, x_m, y_1, \dots, y_n, x_1y_1, \dots, x_my_1, \dots, x_ny_1, \dots, x_ny_n)$$

com inverso dado pela projeção nas

$m + n$ primeiras coordenadas.

Excs. (i) equações de $\Delta_{\mathbb{P}^n}$.

(ii) Fechados de $\mathbb{P}^m \times \mathbb{P}^n$ e polinômios bihomog.

$\dim X$

$\mathbb{A}^n \supseteq X$ = variedade afim irredutível $\Rightarrow$ seu anel de coordenadas $k[X] = k[x_1, \dots, x_n]$ é um domínio.

O corpo de frações $k(X) = k(x_1, \dots, x_n)$ é uma extensão finitamente gerada de k .

O grau de transcendência $\text{tdeg}_k k(X)$ de $k(X)$ sobre k é o número máximo de elementos algebricamente independentes sobre k .

Define-se $\dim X = \text{tdeg}_k k(X)$.

$\dim X$

$U = D(f)$ aberto principal de X

$\Rightarrow k[U] = k[X]_f$, mesmo corpo de frações,
 $k(U) = k(X)$.

Se $U \subseteq X$ ab. afim, existe $f \in k[X]$ tal que

$D(f) = D(f|U)$. Segue $k(U) = k(X)$.

$X = \text{var. irred. não nec. afim}$, define-se

$k(X) = k(U)$ onde $U = \text{ab. afim de } X$.

Independente do aberto afim escolhido: se V é outro ab. afim, temos $U \cap V$ ab. afim de U e

já vimos que $k(U) = k(U \cap V) = k(V)$.

Define-se $\dim X = \dim U = \text{tdeg}_k k(X)$.

$\dim X$

Se $X = \bigcup X_i$ decomposição em fechados irredutíveis maximais, define-se
 $\dim X = \max \dim X_i..$

Prop. Se X é variedade irredutível e $Y \subset X$ é fechado próprio então $\dim Y < \dim X$.

Podemos supor Y irredutível, ambos afins. Logo, existe ideal primo $\mathcal{P} \subset k[X]$, $k[Y] = k[X]/\mathcal{P}$, $\mathcal{P} \neq 0$

Digamos $k[X] = k[x_1, \dots, x_n]$, $y_i =$ restrição de x_i a Y .

Escreva $d = \dim X$, $e = \dim Y$. Podemos supor $y_1, \dots, y_e$ alg.indep. Segue $x_1, \dots, x_e$ alg.indep. $\Rightarrow e \leq d$.

Suponha $d = e$. Tome $f \in \mathcal{P}$, $f \neq 0$. Temos

$f, x_1, \dots, x_e$ alg.dep., digamos

$$a_0(x)f^m + a_1(x)f^{m-1} + \dots + a_m(x) = 0, a_m \neq 0.$$

Reduzindo mod. $\mathcal{P} \Rightarrow a_m(y) = 0 \star$. $\square$

Veremos aprox. linear para cálculo de dim.

$\dim V_X(f) = \dim X - 1$ se X afim, irred., f
não unidade em $k[X]$.

alguns resultados sobre morfismos

1.9.1. Lema. $\phi : X \rightarrow Y$ morfismo de vars. afins,
 $\phi^* : k[Y] \rightarrow k[X]$ homo associado.

(i) ϕ^* sobrej. $\Rightarrow \phi(X)$ fechado em Y ;

(ii) ϕ^* injet. $\iff \phi(X)$ denso em Y ;

(iii) X irred. $\Rightarrow$ idem para o fecho $\overline{\phi X}$ e
 $\dim \overline{\phi X} \leq \dim X$.

Seja $I = \ker \phi^*$; ϕ^* sobre $\Rightarrow \phi X = V_Y(I) \therefore$ (i).

$$(y = \phi x \Rightarrow \mathfrak{m}_y = (\phi^*)^{-1} \mathfrak{m}_x \supseteq I)$$

alguns resultados sobre morfismos

1.9.1. Lema. $\phi : X \rightarrow Y$ morfismo de vars. afins,
 $\phi^* : k[Y] \rightarrow k[X]$ homo associado.

(i) ϕ^* sobrej. $\Rightarrow \phi(X)$ fechado em Y ;

(ii) ϕ^* injet. $\iff \phi(X)$ denso em Y ;

(iii) X irred. $\Rightarrow$ idem para o fecho $\overline{\phi X}$ e
 $\dim \overline{\phi X} \leq \dim X$.

Seja $I = \ker \phi^*$; ϕ^* sobre $\Rightarrow \phi X = V_Y(I) \therefore$ (i).

Agora ϕ^* inj. $\iff \mathcal{I}_Y(\phi X) = \{0\} \therefore$ (ii).

A 1^a afirm de (iii) segue de 1.2,3 junto com

(ii), aplicado ao morfismo $X \rightarrow \overline{\phi X}$.

Note que $\overline{\phi X} = V_Y(I)$.

a imagem contém um aberto de seu fecho

$\phi : X \rightarrow Y$ é dito dominante se $\overline{\phi X} = Y$.

Teor. ϕ domin. $\Rightarrow \phi X$ contém um aberto de Y .

Podemos supor X irredutível. De fato, se valer nesse caso, considere as restrições de ϕ a cada componente de X com imagem densa em Y .

Podemos supor X, Y afins (e irredutíveis).

(Exc.)

tradução algébrica

$A = k[Y] \subseteq B = k[X]$ domínios. Mostrar que

♥ $\forall b \in B, b \neq 0 \Rightarrow \exists a \in A, a \neq 0$ t.q. todo
 $\psi : A \rightarrow k, \psi(a) \neq 0$ se estende a
 $\tilde{\psi} : B \rightarrow k, \tilde{\psi}(b) \neq 0$.

Reinterprete: ψ corresponde a um ponto $y \in Y$ no aberto básico $D_Y(a)$. A extensão representa um ponto $x \in D_X(b) \subseteq X$ que se envia em y .

Conclusão: o aberto básico $D_Y(a) \subset Y$ está contido na imagem do aberto básico $D_X(b) \subset X$.

O teorema de extensão:

$A \subset B$ =domínio de tipo finito sobre $A \Rightarrow$

$\forall b \in B, b \neq 0 \Rightarrow \exists a \in A, a \neq 0$ t.q. todo

$\psi : A \rightarrow k, \psi(a) \neq 0$ se estende a

$\tilde{\psi} : B \rightarrow k, \tilde{\psi}(b) \neq 0$.

$A \subset B$

$\forall \psi \downarrow \swarrow \exists \tilde{\psi}$

k

(alg.fech.)

Sejam $A \subseteq B \subseteq C$ como acima. Se valer para $A \subseteq B$ e para $B \subseteq C$ então vale para $A \subseteq C$.

$$\exists a \in A \subset B \ni b \quad \forall b \in B \subset C \ni c$$

$$\forall \psi \dots \downarrow \swarrow \exists \tilde{\psi} \\ k$$

$$\forall \phi \dots \downarrow \swarrow \exists \tilde{\phi} \\ k$$

Dados $c, \psi \dots$ queremos a tal que $\psi a \neq 0 \Rightarrow \exists \tilde{\phi} \dots$

Temos $b \dots$ para o qual $\exists a \dots$

Agora $\psi a \neq 0 \Rightarrow \exists \tilde{\psi}, \tilde{\psi} b \neq 0$. Faça $\phi = \tilde{\psi} \dots$

Sejam $A \subseteq B \subseteq C$ como acima. Se valer para $A \subseteq B$ e para $B \subseteq C$ então vale para $A \subseteq C$.

$$\begin{array}{ccc} \exists a \in A \subset B \ni b & \forall & \exists b \in B \subset C \ni c \\ \forall \psi \dots \downarrow \swarrow \exists \tilde{\psi} & & \forall \phi \dots \downarrow \swarrow \exists \tilde{\phi} \\ k & & k \end{array}$$

Dados $c, \psi \dots$ queremos a tal que $\psi a \neq 0 \Rightarrow \exists \tilde{\phi} \dots$

Temos $b \dots$ para o qual $\exists a \dots$

Agora $\psi a \neq 0 \Rightarrow \exists \tilde{\psi}, \tilde{\psi} b \neq 0$. Faça $\phi = \tilde{\psi} \dots$

O uso da fatoração $A \subset B \subset C$

impõe a necessidade do $\forall b \dots$.

$B = A[b_1, \dots, b_m]$, proceder por indução em m .

O argumento $A \subseteq B \subseteq C$ acima permite reduzir ao caso $m = 1$, $B = A[b_1] = A[T]/I$, $I \neq 0$.

Tome $f \in I \setminus 0$ de grau mínimo, coef. líder α .

Temos $f(b_1) = 0$, f irredutível sobre $Fr A$;

$B = A[b_1, \dots, b_m]$, proceder por indução em m .

O argumento $A \subseteq B \subseteq C$ acima permite reduzir ao caso $m = 1$, $B = A[b_1] = A[T]/I$, $I \neq 0$.

Tome $f \in I \setminus 0$ de grau mínimo, coef. líder α .

Temos $f(b_1) = 0$, f irredutível sobre $Fr A$;
algoritmo da divisão $\Rightarrow I = \{g \mid \exists d \geq 0, \alpha^d g \in \langle f \rangle\}$.

$B = A[b_1, \dots, b_m]$, proceder por indução em m .

O argumento $A \subseteq B \subseteq C$ acima permite reduzir ao caso $m = 1$, $B = A[b_1] = A[T]/I$, $I \neq 0$.

Tome $f \in I \setminus 0$ de grau mínimo, coef. líder α .

Temos $f(b_1) = 0$, f irredutível sobre $Fr A$;
algoritmo da divisão $\Rightarrow I = \{g \mid \exists d \geq 0, \alpha^d g \in \langle f \rangle\}$.

Seja $h \in A[T]$ tal que $h(b_1) = b \neq 0$.

Temos $\text{mdc}(h, f) = 1$ em $(Fr A)[T]$. Logo,
 $\exists u, v \in A[T]$, $\alpha' \in A \setminus 0$, $uf + vh = \alpha'$. Assim,
 $\alpha' = (uf + vh)(b_1) = v(b_1)b$.

$B = A[b_1, \dots, b_m]$, proceder por indução em m .

O argumento $A \subseteq B \subseteq C$ acima permite reduzir ao caso $m = 1$, $B = A[b_1] = A[T]/I$, $I \neq 0$.

Tome $f \in I \setminus 0$ de grau mínimo, coef. líder α .

Temos $f(b_1) = 0$, f irredutível sobre $Fr A$;
algoritmo da divisão $\Rightarrow I = \{g \mid \exists d \geq 0, \alpha^d g \in \langle f \rangle\}$.

Seja $h \in A[T]$ tal que $h(b_1) = b \neq 0$.

Temos $\text{mdc}(h, f) = 1$ em $(Fr A)[T]$. Logo,
 $\exists u, v \in A[T]$, $\alpha' \in A \setminus 0$, $uf + vh = \alpha'$. Assim,

$$\alpha' = (uf + vh)(b_1) = v(b_1)b.$$

Mostraremos que $a = \alpha\alpha'$ funciona.

$$a = \alpha\alpha' \in A \subset B = A[T]/I \ni b = h(b_1)$$

$A[b_1]$
||

$$A[b_1]$$

$$\parallel$$

$$a = \alpha\alpha' \in A \subset B = A[T]/I \ni b = h(b_1)$$

$$\forall \psi$$

$$\psi a \neq 0 \downarrow$$

$$\swarrow \exists \tilde{\psi}$$

$$I \subset A[T] \xrightarrow{\hat{\psi}} k$$

Certamente podemos estender ψ a $\hat{\psi} : A[T] \rightarrow k$.

$$A[b_1]$$

$$a = \alpha\alpha' \in A \subset B = A[T]/I \ni b = h(b_1)$$

$$\begin{array}{c} \forall \psi \\ \psi a \neq 0 \\ \downarrow \end{array}$$

$$\swarrow \exists \tilde{\psi}$$

$$I \subset A[T] \xrightarrow{\hat{\psi}} k$$

Certamente podemos estender ψ a $\hat{\psi} : A[T] \rightarrow k$.

Passar ao quociente para obter $\tilde{\psi} : B \rightarrow k$ requer

$$\hat{\psi}I = 0.$$

$$\begin{array}{c} A[b_1] \\ || \\ || \end{array}$$

$$a = \alpha\alpha' \in A \subset B = A[T]/I \ni b = h(b_1)$$

$$\begin{array}{c} \forall \psi \\ \psi a \neq 0 \\ \downarrow \end{array}$$

$$\swarrow \exists \tilde{\psi}$$

$$I \subset A[T] \xrightarrow{\hat{\psi}} k$$

Certamente podemos estender ψ a $\hat{\psi} : A[T] \rightarrow k$.

Passar ao quociente para obter $\tilde{\psi} : B \rightarrow k$ requer

$\hat{\psi}I = 0$. Seja $\bar{f}(T)$ a imagem de f pelo homo

induzido $A[T] \xrightarrow{\psi} k[T]$. Como $\psi\alpha \neq 0$, temos

$\bar{f}(T) \notin k$ e assim existe raiz $\gamma \in k$.

$$A[b_1]$$

$$\parallel$$

$$a = \alpha\alpha' \in A \subset B = A[T]/I \ni b = h(b_1)$$

$$\forall \psi$$

$$\psi\alpha \neq 0 \downarrow$$

$$\swarrow \exists \tilde{\psi}$$

$$I \subset A[T] \xrightarrow{\hat{\psi}} k$$

Certamente podemos estender ψ a $\hat{\psi} : A[T] \rightarrow k$.

Passar ao quociente para obter $\tilde{\psi} : B \rightarrow k$ requer

$\hat{\psi}I = 0$. Seja $\bar{f}(T)$ a imagem de f pelo homo

induzido $A[T] \xrightarrow{\psi} k[T]$. Como $\psi\alpha \neq 0$, temos

$\bar{f}(T) \notin k$ e assim existe raiz $\gamma \in k$. Faça

$$\hat{\psi}(T) = \gamma.$$

$$A[b_1]$$

$$a = \alpha\alpha' \in A \subset B = A[T]/I \ni b = h(b_1)$$

$$\begin{array}{c} \forall \psi \\ \psi a \neq 0 \\ \downarrow \end{array}$$

$$\swarrow \exists \tilde{\psi}$$

$$I \subset A[T] \xrightarrow{\hat{\psi}} k$$

Certamente podemos estender ψ a $\hat{\psi} : A[T] \rightarrow k$.

Passar ao quociente para obter $\tilde{\psi} : B \rightarrow k$ requer

$\hat{\psi}I = 0$. Seja $\bar{f}(T)$ a imagem de f pelo homo

induzido $A[T] \xrightarrow{\psi} k[T]$. Como $\psi\alpha \neq 0$, temos

$\bar{f}(T) \notin k$ e assim existe raiz $\gamma \in k$. Faça

$\hat{\psi}(T) = \gamma$. Pela descrição de $I \ni g$,

$$A[b_1] \\ \parallel$$

$$a = \alpha\alpha' \in A \subset B = A[T]/I \ni b = h(b_1)$$

$$\forall \psi \\ \psi\alpha \neq 0 \downarrow$$

$$\swarrow \exists \tilde{\psi}$$

$$I \subset A[T] \xrightarrow{\hat{\psi}} k$$

Certamente podemos estender ψ a $\hat{\psi} : A[T] \rightarrow k$.

Passar ao quociente para obter $\tilde{\psi} : B \rightarrow k$ requer

$\hat{\psi}I = 0$. Seja $\bar{f}(T)$ a imagem de f pelo homo

induzido $A[T] \xrightarrow{\psi} k[T]$. Como $\psi\alpha \neq 0$, temos

$\bar{f}(T) \notin k$ e assim existe raiz $\gamma \in k$. Faça

$\hat{\psi}(T) = \gamma$. Pela descrição de $I \ni g$, $\alpha^d g = g' f \in \langle f \rangle$,

$$\begin{array}{c} A[b_1] \\ || \\ || \end{array}$$

$$a = \alpha\alpha' \in A \subset B = A[T]/I \ni b = h(b_1)$$

$$\begin{array}{c} \forall \psi \\ \psi\alpha \neq 0 \\ \downarrow \end{array}$$

$$\swarrow \exists \tilde{\psi}$$

$$I \subset A[T] \xrightarrow{\hat{\psi}} k$$

Certamente podemos estender ψ a $\hat{\psi} : A[T] \rightarrow k$.

Passar ao quociente para obter $\tilde{\psi} : B \rightarrow k$ requer

$\hat{\psi}I = 0$. Seja $\bar{f}(T)$ a imagem de f pelo homo

induzido $A[T] \xrightarrow{\psi} k[T]$. Como $\psi\alpha \neq 0$, temos

$\bar{f}(T) \notin k$ e assim existe raiz $\gamma \in k$. Faça

$\hat{\psi}(T) = \gamma$. Pela descrição de $I \ni g$, $\alpha^d g = g' f \in \langle f \rangle$,

segue $\hat{\psi}(g) = g'(\gamma)\bar{f}(\gamma)/\psi\alpha^d = 0$.

$$\begin{array}{c} A[b_1] \\ || \\ || \end{array}$$

$$a = \alpha\alpha' \in A \subset B = A[T]/I \ni b = h(b_1)$$

$$\begin{array}{c} \forall \psi \\ \psi \alpha \neq 0 \\ \downarrow \end{array}$$

$$\swarrow \exists \tilde{\psi}$$

$$I \subset A[T] \xrightarrow{\hat{\psi}} k$$

Certamente podemos estender ψ a $\hat{\psi} : A[T] \rightarrow k$.

Passar ao quociente para obter $\tilde{\psi} : B \rightarrow k$ requer

$\hat{\psi}I = 0$. Seja $\bar{f}(T)$ a imagem de f pelo homo

induzido $A[T] \xrightarrow{\psi} k[T]$. Como $\psi\alpha \neq 0$, temos

$\bar{f}(T) \notin k$ e assim existe raiz $\gamma \in k$. Faça

$\hat{\psi}(T) = \gamma$. Pela descrição de $I \ni g$, $\alpha^d g = g' f \in \langle f \rangle$,

segue $\hat{\psi}(g) = g'(\gamma)\bar{f}(\gamma)/\psi\alpha^d = 0$. Note que

$\tilde{\psi}b = \hat{\psi}(h(T)) \neq 0$ pela definição de α' .

excs

- Complete detalhes acima.
- Se X é var. afim, mostre que os fechados de $X \times \mathbb{P}^n$ são interseções de zeros de polinômios homogêneos $\sum a_i(x)y^i$, $|i| = d$, $a_i(x) \in k[X]$, onde $y = (y_0, \dots, y_n)$ são coordenadas homogêneas. ($\mathbb{P}^n = U_0 \cup \dots \cup U_n$)
- Fechados de $\mathbb{P}^m \times \mathbb{P}^n$ e bi-homogs.
- Equações para $\Delta_{\mathbb{P}^1} \subset \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1 \xrightarrow{\text{segre}} \mathbb{P}^3$; retas da quádrlica imagem...

GAL

Um Grupo Algébrico é uma variedade G
munida

de estrutura de grupo de modo que as operações

$$G \times G \xrightarrow{\mu} G$$

$$(g, g') \longmapsto gg'$$

$$G \xrightarrow{i} G$$

$$g \longmapsto g^{-1}$$

são morfismos. Se G é afim, GAL.

Homo de g.a. é morfismo...

$$G, G' \text{ g.a.s} \Rightarrow G \times G' \text{ idem.}$$

exs

1. $\mathbb{A}^1$, grupo aditivo.
2. $G_m := k^\star = \mathbb{A}^1 \setminus 0$ grupo multiplicativo.
3. $GL_n : \det \neq 0$ grupo linear geral.
4. $D_n \subseteq T_n$, diags, triangos.
5. $SL_n : \det = 1$.
6. $O_n : X^t X = I$ ortogonal.
7. ...Descreva os anéis de coordenadas.

Se G é uma pré-variedade com estrutura de grupo algébrico, então é de fato uma variedade.

Se G é uma pré-variedade com estrutura de grupo algébrico, então é de fato uma variedade.

Mostrar $\Delta_G \subset G \times G$ é fechada: olhe o mapa
 $(x, y) \mapsto xy^{-1}$.

O ponto $e \in G$ é fechado e Δ_G é a imagem inversa.

Se G é uma pré-variedade com estrutura de grupo algébrico, então é de fato uma variedade.

Mostrar $\Delta_G \subset G \times G$ é fechada: olhe o mapa
 $(x, y) \mapsto xy^{-1}$.

O ponto $e \in G$ é fechado e Δ_G é a imagem inversa.

$g \in G = \text{grupo algébrico} \Rightarrow$

$$x \mapsto gx \quad \text{e} \quad x \mapsto xg$$

são isos da variedade G .

fatos preliminares

G admite exatamente uma componente irredutível

$$G^\circ \ni e.$$

fatos preliminares

G admite exatamente uma componente irredutível

$$G^\circ \ni e.$$

Se X, Y são compon. irred. $\ni e$, olhe para

$$Z := \overline{\mu(X \times Y)} \subseteq G.$$

É um fechado irred. que contém X, Y , logo

$$Z = X = Y.$$

G° é um sg. fechado normal e de índice finito.
Trata-se da única componente conexa de G
contendo e .

G° é um sg. fechado normal e de índice finito.
Trata-se da única componente conexa de G
contendo e .

Novamente

$$G^\circ = \overline{\mu(G^\circ \times G^\circ)} = i(G^\circ) = xG^\circ x^{-1} \subseteq G.$$

G° é um sg. fechado normal e de índice finito.
Trata-se da única componente conexa de G
contendo e .

Novamente

$$G^\circ = \overline{\mu(G^\circ \times G^\circ)} = i(G^\circ) = xG^\circ x^{-1} \subseteq G.$$

As classes laterais de G° em G são as
componentes irredutíveis de G . Disjunção
 $\Rightarrow$ são as componentes conexas.

Todo sg. fechado de G de índice finito contém G° .

Todo sg. fechado de G de índice finito contém G° .

Se H é sg. fechado, então H° é a única componente irredutível de H por e . Índice finito
 $\Rightarrow G =$ união disjunta de classes laterais de H .

Segue evidentemente $G^\circ \subseteq H^\circ$.

Todo sg. fechado de G de índice finito contém G° .

Se H é sg. fechado, então H° é a única componente irredutível de H por e . Índice finito
 $\Rightarrow G =$ união disjunta de classes laterais de H .

Segue evidentemente $G^\circ \subseteq H^\circ$.

Os grupos $G_a, G_m, GL_n, D_n, T_n, U_n, SL_n$ são conexos.

O polinômio $\det - 1$ é irredutível.

O_n não é conexo: a imagem de $\det$ é $\{\pm 1\}$.

$$SO_n = O_n^\circ$$

Abrevie $G := O_n$;

$V :=$ espaço das matrizes anti-simétricas,
 $\dim V = n(n - 1)/2$.

$V_0 := \{y \in V \mid \det(1 + y) \neq 0\}$ é aberto de V .

$G_0 := \{x \in G \mid \det(1 + x) \neq 0\}$ é aberto de G .

$$V_0 \ni y \mapsto x = (1 - y)(1 + y)^{-1}$$

$$G_0 \ni x \mapsto y = (1 + x)^{-1}(1 - x)$$

(transformada de Cayley)

são inversas uma da outra.

[mathoverflow]

$$G_0 \ni x \Rightarrow y := (1 + x)^{-1}(1 - x) \in V :$$

$$G_0 \ni x \Rightarrow y := (1+x)^{-1}(1-x) \in V :$$

$${}^t y = {}^t(1-x) \left({}^t(1+x)^{-1} \right) \stackrel{?}{=} -y$$

$$G_0 \ni x \Rightarrow y := (1+x)^{-1}(1-x) \in V :$$

$${}^t y = {}^t(1-x) \left({}^t(1+x)^{-1} \right) \stackrel{?}{=} -y \iff$$

$$(1+x)(1-{}^t x) \stackrel{?}{=} -(1-x)(1+{}^t x)$$

$$G_0 \ni x \Rightarrow y := (1+x)^{-1}(1-x) \in V :$$

$${}^t y = {}^t(1-x) \left({}^t(1+x)^{-1} \right) \stackrel{?}{=} -y \iff$$

$$(1+x)(1-{}^t x) \stackrel{?}{=} -(1-x)(1+{}^t x) \iff$$

$$1+x-{}^t x-x{}^t x \stackrel{?}{=} -(1-x+{}^t x-x{}^t x) \iff$$

$$1 \stackrel{\checkmark}{=} x{}^t x$$

$$G_0 \ni x \Rightarrow y := (1 + x)^{-1}(1 - x) \in V :$$

$${}^t y = {}^t(1 - x) \left({}^t(1 + x)^{-1} \right) \stackrel{?}{=} -y \iff$$

$$(1 + x)(1 - {}^t x) \stackrel{?}{=} -(1 - x)(1 + {}^t x) \iff$$

$$1 + x - {}^t x - x {}^t x \stackrel{?}{=} -(1 - x + {}^t x - x {}^t x) \iff$$

$$1 \stackrel{\checkmark}{=} x {}^t x \quad (-:\text{OK}:-)$$

$$G_0 \ni x \Rightarrow y := (1 + x)^{-1}(1 - x) \stackrel{!}{\in} V :$$

$${}^t y = {}^t(1 - x) \left({}^t(1 + x)^{-1} \right) \stackrel{?}{=} -y \iff$$

$$(1 + x)(1 - {}^t x) \stackrel{?}{=} -(1 - x)(1 + {}^t x) \iff$$

$$1 + x - {}^t x - x {}^t x \stackrel{?}{=} -(1 - x + {}^t x - x {}^t x) \iff$$

$$1 \stackrel{\checkmark}{=} x {}^t x \quad (-:\text{OK}:-)$$

$$y \in V_0 \Rightarrow x := (1 - y)(1 + y)^{-1} \stackrel{!}{\in} G_0$$

$$G_0 \ni x \Rightarrow y := (1 + x)^{-1}(1 - x) \stackrel{!}{\in} V :$$

$${}^t y = {}^t(1 - x) \left({}^t(1 + x)^{-1} \right) \stackrel{?}{=} -y \iff$$

$$(1 + x)(1 - {}^t x) \stackrel{?}{=} -(1 - x)(1 + {}^t x) \iff$$

$$1 + x - {}^t x - x {}^t x \stackrel{?}{=} -(1 - x + {}^t x - x {}^t x) \iff$$

$$1 \stackrel{\checkmark}{=} x {}^t x \quad (-:\text{OK}:-)$$

$$y \in V_0 \Rightarrow x := (1 - y)(1 + y)^{-1} \stackrel{!}{\in} G_0$$

$$(1 + x)y = 1 - x \Rightarrow y - 1 = -x(1 + y)$$

$\Rightarrow$ inversas

$$G_0 \ni x \Rightarrow y := (1+x)^{-1}(1-x) \stackrel{!}{\in} V :$$

$${}^t y = {}^t(1-x) \left({}^t(1+x)^{-1} \right) \stackrel{?}{=} -y \iff$$

$$(1+x)(1-{}^t x) \stackrel{?}{=} -(1-x)(1+{}^t x) \iff$$

$$1+x-{}^t x-x{}^t x \stackrel{?}{=} -(1-x+{}^t x-x{}^t x) \iff$$

$$1 \stackrel{\checkmark}{=} x{}^t x \quad (-:\text{OK}:-)$$

$$y \in V_0 \Rightarrow x := (1-y)(1+y)^{-1} \stackrel{!}{\in} G_0$$

$$(1+x)y = 1-x \Rightarrow y-1 = -x(1+y)$$

$\Rightarrow$ inversas

$$V_0 \text{ irred. } \ni 0 \leftrightarrow 1 \in G_0$$

$$\det x = 1, x \in SO_n.$$

U, V abertos densos de $G \Rightarrow UV = G$.

$x \in G \Rightarrow xV^{-1}$ aberto denso $\Rightarrow$

$xV^{-1} \cap U \neq \emptyset \Rightarrow \exists xv^{-1} \in U \Rightarrow x \in UV$.

H sg $G \Rightarrow \overline{H}$ sg G .

$\mu(H \times H) \subseteq H \Rightarrow \overline{\mu(H \times H)} \subseteq \overline{H} \Rightarrow$

(continuidade) $\mu(\overline{H \times H}) \subseteq \overline{\mu(H \times H)}$;

$\overline{H} \times \overline{H} = \overline{H \times H} \Rightarrow \mu(\overline{H} \times \overline{H}) \subseteq \overline{H \times H}$.

Similar para $i\overline{H} = \overline{H}$.

Se $H \supseteq U = \text{aberto} \neq \emptyset$ de $\overline{H}$ então $H = \overline{H}$.

$H = \bigcup_{x \in H} xU$ ab. em $\overline{H}$, denso $\Rightarrow \overline{H} = HH = H$.

$\varphi : G \longrightarrow G'$ homo de g.as. $\Rightarrow$

• $\ker \phi$ sg. fechado normal de G ;

• ϕG sg. fechado de G' e $\phi G^\circ = (\phi G)^\circ$.

ϕG contém aberto de seu fecho, logo $\phi G = \overline{\phi G}$.

ϕG° fechado em ϕG e conexo, de índice finito

$\Rightarrow \phi G^\circ = (\phi G)^\circ$.

Família $\phi_i : X_i \rightarrow G$, X_i irred, $Y_i := \phi_i X_i \ni e$, $Y_i^{-1} = Y_{i'}$,
 $H =$ menor sg. fechado de G contendo todos os $Y_i \Rightarrow$

- H é conexo;
- existem $i_1, \dots, i_n$ tais que $H = Y_{i_1} \cdots Y_{i_n}$.

Para $i := i_1, \dots, i_n$ escreva $Y^i = Y_{i_1} \cdots Y_{i_n}$, subv. irred

Escolha i com $\dim \overline{Y^i}$ máxima. Para todo j

segue $\overline{Y^i} \subseteq \overline{Y^i Y^j} \subseteq \overline{Y^{i,j}} = \overline{Y^i} \Rightarrow \overline{Y^i}$ sg

e de fato $\overline{Y^i} = Y^i Y^i = Y^i = H$.

$G_i \subseteq G$ família de sgs fechados, conexos
 $\Rightarrow H :=$ gerado por eles é fechado conexo e
gerado por um número finito de G_i 's.

H, K sgs de G ,
 $(H, K) = \langle xyx^{-1}y^{-1}, x \in H, y \in K \rangle$
comutadores.

H, K sgs fechados e um deles conexos
 $\Rightarrow (H, K)$ conexo, fechado.

Digamos H conexo. Usar a família
 $\phi_i(x) = xix^{-1}i^{-1}, i \in K.$

ações

X =variedade, G =grupo algébrico, um morfismo

$$\begin{array}{ccc} G \times X & \xrightarrow{a} & X \\ (g, x) & \longmapsto & a(g, x) = g.x \end{array}$$

é uma ação se

- $e.x = x \forall x \in X$
- $g.(g'.x) = (gg').x \forall x \in X, g, g' \in G.$

Diz-se então que X é um G -espaço.

exemplos

- $\mu : G \times G \longrightarrow G$ multiplicação (à esquerda).
- $\mu : G \times G \longrightarrow G$ conjugação $g.x = gxg^{-1}$.
- $X = M_{m \times n}$ matrizes, $G = GL_m$ age por multiplicação (à esquerda).

órbita, estabilizador

$$X = G\text{-espaço}$$